

# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ฉบับวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563

## คอลัมน์ หนามองฟ้า เท้าเหยงดิน : ถั่วลิสง...เสี่ยง 2 โรคครุมเรา



สภาพอากาศในระยะนี้เอื้อให้เชื้อราก่อโรคพืชแพร่ระบาดได้ดีกรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงให้หมั่นสังเกตอาการ โรคใบจุดสีดำ และ โรคใบจุดสีน้ำตาล

โรคใบจุดสีดำ จะพบการระบาดทั่วประเทศ ทำความเสียหายให้กับถั่วลิสงมากในฤดูฝนอาการของโรคจะเกิดแผลที่ใบ เริ่มจาก

ใบตอนล่างก่อน แผลจะมีสีดำหรือน้ำตาลเข้ม รูปร่างค่อนข้างกลม ขนาดไม่แน่นอน ใหญ่สุดประมาณ 5-8 มม. ขอบแผลอาจมีวงสีเหลืองล้อมรอบหากอาการรุนแรง แผลจะขยายขนาดมากขึ้น ใบจะเหลือง ขอบใบบิดเบี้ยว ใบใหม่เป็นสีน้ำตาลดำ และร่วงก่อนกำหนด โรคจะลุกลามขึ้นสู่ใบด้านบน หรืออาจพบอาการของโรคบนหุบใบ ก้าน ลำต้น และขั้วฝัก

ส่วน โรคใบจุดสีน้ำตาล อาการของโรคในระยะเริ่มแรก จะมีแผลจุดสีน้ำตาลบนใบที่อยู่ด้านล่าง ขอบแผลอาจมีวงสีเหลืองล้อมรอบ หากอาการของโรครุนแรง จะพบอาการของโรคบนหุบใบ ก้าน ลำต้น และขั้วฝัก ทำให้ใบร่วงก่อนกำหนด และโรคจะลุกลามขึ้นสู่ใบด้านบน

สำหรับการป้องกันกำจัด 2 โรคนี้ ให้เกษตรกรหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากในแปลงปลูกถั่วลิสงเริ่มพบแสดงอาการของทั้ง 2 โรค ให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เบโนมิล 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 15-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือแมนโคเซบ 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นทุก 7-10 วัน

ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วลิสง ควรทำลายซากต้นถั่วลิสงด้วยการไถกลบให้ลึก เพื่อตัดวงจรเชื้อราก่อโรคไม่ให้แพร่ระบาดในฤดูถัดไป ในแปลงที่พบการระบาดของโรคนี้แล้ว เกษตรกรควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และข้าวโพด เป็นต้น อีกทั้งควรล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรต่างๆ ให้สะอาด และผึ่งแดดให้แห้ง หลังการใช้งานทุกครั้งอยู่เสมอ เมื่อได้นำไปใช้กับต้นที่เป็นโรคในแปลงที่มีการระบาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ในครั้งต่อไป