

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ฉบับวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2563

หม่อมองฟ้า เท้าหยั่งดิน : จับตาหนอนชอนใบมะเขือเทศ



ฤดูปลูกมะเขือเทศรอบใหม่ กรมวิชาการ
เกษตร แจกเตือนเกษตรกร โรงเรือนผลิตกล้ามะเขือ
เทศ จุดรวบรวมผลผลิตและตลาด เผ่าระวังการ
ระบาดของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะจังหวัดตาก เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน
แหล่งปลูกมะเขือเทศสำคัญของไทย หากระบาดมาก

จะทำให้ผลผลิตเสียหายเกือบ 100% เนื่องจากสถานการณ์ล่าสุดได้รับรายงานในประเทศเพื่อนบ้านและ
พื้นที่การระบาดอยู่ใกล้ชายแดนไทยมากขึ้น

ขณะนี้กรมวิชาการฯ ได้กำชับให้ด่านตรวจพืชเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบสินค้าที่นำเข้ามาตามแนว
ชายแดน ตรวจพืชต้องสงสัยที่นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านให้ละเอียด รวมทั้งได้ให้สำนักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช นำกับดักฟีโรโมนที่ไปติดตั้งไว้บริเวณช่องทางผ่านชายแดน 48 ด่านทั่วประเทศ สำหรับ
เกษตรกรแนะนำให้ใช้ต้นกล้ามะเขือเทศและวัสดุปลูกที่ปลอดจากหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ และ
ตรวจหาการทำลาย โดยสำรวจร่องรอยการทำลายบนใบมะเขือเทศ ผล ดอก และยอด หรือติดตั้งกับ
ดักฟีโรโมน ไร่ละ 6-8 กับดัก แม้ในขณะนี้จะยังไม่พบการระบาด แต่ได้มีการจัดทำคำแนะนำการ
ป้องกันกำจัดไว้พร้อมแล้ว...หากตรวจพบผีเสื้อหรือการทำลายของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศแนะนำให้
ใช้ เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส สายพันธุ์เคอร์สตากี ฉีดพ่นทุก 4-7 วัน เมื่อพบการระบาดใน
ระยะเริ่มต้นหรือระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่วนการใช้สารเคมีป้องกันกำจัด ได้แก่ อีมาเมกติน เบนโซเอต,
คลอแรนทรานิลิโพรล, สไปนีโทแรม, อินดอกซาคาร์บ, ลูเฟนนูรอน ฉีดพ่นทุก 4-7 วัน ติดต่อกัน 2-3
ครั้ง ให้ใช้กลุ่มสารสลับกันอย่างน้อย 2 กลุ่ม ใน 1 รอบวงจรชีวิต 30 วัน และเว้นระยะไม่ใช้สารกลุ่ม
เดิมในรอบวงจรชีวิตถัดไปเพื่อลดการดื้อยา จึงขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันเฝ้าระวัง
หากพบแมลงศัตรูพืชที่มีลักษณะคล้ายหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน 06-

1415-2517

สะ-เล-เต