

# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

## ฉบับวันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563

### ปราบด้วงแรดมะพร้าว



ด้วงแรดเป็นแมลงศัตรูพืชสำคัญของมะพร้าว ลำดับที่ 3 รองจากหนอนหัวดำ และแมลงดำหนาม ที่เป็นแมลงมาจากต่างถิ่น แม้จะเป็นแมลงประจำถิ่น แต่ไหนแต่ไรมาการระบาดของมันไม่ค่อยมากนัก เพิ่งจะมาหนักในช่วงหลังๆ เนื่องจากมีการโค่นล้มต้นมะพร้าว ต้นปาล์มที่มีอายุมาก เพื่อปลูกใหม่ทดแทน...แล้ว

ปล่อยให้ต้นที่ถูกโค่นเน่าเปื่อยไว้ในสวน กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของด้วงแรด เพราะซากเน่าเปื่อยต้นมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน ซากเปลือกมะพร้าว ทะลายปาล์ม กองมูลสัตว์เก่า กองปุ๋ยคอก กองขุยมะพร้าว กองกากเมล็ดกาแฟ กองขยะ ล้วนแต่เป็นแหล่งอาหารชั้นเลิศในการเลี้ยงหนอนด้วงแรด

สำหรับการป้องกันกำจัด กรมวิชาการเกษตร แนะนำให้ใช้วิธีป้องกันกำจัดแบบผสมผสานวิธีเขตกรรมชีววิธี และการใช้สารเคมี

วิธีเขตกรรม ให้หมั่นรักษาความสะอาดและกำจัดเศษวัสดุต้นมะพร้าวบริเวณสวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำจัดแหล่งขยายพันธุ์ ถ้ามีกองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก

กองขยะ กองขี้เลื่อย กองแกลบ ควรกำจัดออกไปจากสวนหรือกองให้เป็นที่ หมั่นกลับกองเพื่อตรวจดูหนอนด้วงแรดมะพร้าว...หากพบหนอนให้จับมาทำลายหรือเผากองนั้นทิ้งทันที ส่วนลำต้นและตอมะพร้าวที่โค่นทิ้งไว้ หรือมะพร้าวที่ยืนต้นตายควรโค่นลงมาเผาทำลาย กรณีต้นมะพร้าวที่ถูกตัดแล้วยังสดอยู่ให้นำมาทำกับดักล่อให้ด้วงแรดมะพร้าวมาวางไข่ ตัดท่อนอกเป็นท่อนสั้นๆ นำมาวางเรียงรวมกันไว้ให้เปลือกมะพร้าวติดกับพื้นดิน เพราะด้วงแรดมะพร้าวจะ



วางไข่บริเวณที่ชุ่มชื้นสูงและดูเร็ว จากนั้นให้เกษตรกรเผาทำลายท่อนกับดักเพื่อกำจัดทั้งไข่ หนอน และดักแด้ของด้วงแรดมะพร้าว สำหรับตอมะพร้าวที่เหลือให้ใช้น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วราดให้ทั่วตอ เพื่อป้องกันการวางไข่ได้

ชีววิธี ใช้เชื้อราเขียวเมตาโรเซียมใส่ตามกองขยะ กองปุ๋ยคอก หรือกับดักท่อนมะพร้าวที่มีหนอน ด้วงแรดมะพร้าว อาศัยอยู่ และเกลี้ยเชื้อให้กระจายทั่วกอง เพื่อให้เชื้อมีโอกาสสัมผัสกับตัวหนอนให้มากที่สุด จากนั้นรดน้ำให้ความชื้นและหาวัสดุใบมะพร้าวมาคลุมกองไว้ เพื่อรักษาความชื้นและป้องกันแสงแดด

ส่วนการใช้สารเคมี เหมาะกับต้นมะพร้าวอายุ 3-5 ปี ที่ยังไม่สูงมาก ใช้ลูกเหม็นใส่บริเวณ  
คอมะพร้าวที่โคนทางใบรอบๆยอดอ่อน ทางละ 2 ลูก ต้นละ 6-8 ลูก กลิ่นของลูกเหม็นจะไล่  
ไม่ให้ด้วงแรดบินเข้าไปทำลายคอมะพร้าว



ไบโหมไม่สมบูรณ์ มีรอยขาดแหว่งเป็นริ้วๆ คล้ายหางปลาหรือรูปพัด

หากระบาดมาก ให้ใช้สารฆ่าแมลง ไดอะซินอน 60% อี  
ซี หรือคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี ชนิดใดชนิดหนึ่ง อัตรา 80  
มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ราดบริเวณคอมะพร้าวให้เปียก  
ตั้งแต่โคนยอดอ่อนลงมา โดยใช้ปริมาณ 1-1.5 ลิตรต่อต้น  
ทุก 15-20 วัน และควรใช้ 1-2 ครั้ง ในช่วงมีการระบาด...  
ด้วงแรดตัวเต็มวัยบินมากัดเจาะโคนทางใบหรือยอดอ่อน  
ของมะพร้าว โดยเจาะทำลายยอดอ่อนที่ใบยังไม่คลี่ ทำให้

**ชาติชาย ศิริพัฒน์**