

# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

## วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564

### คอลัมน์หม่อมองฟ้า เท้าหยั่งดิน : ถั่วลิสงระวังโรคลำต้นเน่า



ระยะนี้ฝนตกชุกสลับกับมีอากาศร้อน กรมวิชาการเกษตร เตือนผู้ปลูกถั่วลิสงเผ่าระวัง โรคลำต้นเน่า ที่มีระบาดรุนแรงในฤดูฝน

อาการเริ่มแรกจะพบต้นถั่วลิสงแสดงอาการเหี่ยวและยุบตัวเป็นหย่อมๆ ในแปลงปลูก ส่วนบริเวณโคนต้นเหนือผิวดินจะพบแผลสีน้ำตาลที่มี

เส้นใยสีขาวหยาบของเชื้อราก่อโรค ต่อมาเส้นใยจะรวมตัวเป็นเม็ดเล็กสีขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มจนเกือบดำคล้ายเมล็ดผักกาด จากนั้นต้นจะแห้งและตาย

โรคนี้มักพบระบาดมากในระยะติดฝักจนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตการป้องกันกำจัดเกษตรกรควรหมั่นตรวจและกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูก หากพบต้นถั่วลิสงที่เริ่มแสดงอาการของโรคลำต้นเน่า ให้ถอนต้นและขุดดินบริเวณที่พบเป็นโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูกทันที จากนั้นให้รดดินในหลุมที่ขุดและบริเวณใกล้เคียง

ด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช คาร์บอกซิน 75% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โทลโคลฟอส-เมทิล 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อีไตรไดอะโซล 24% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อีไตรไดอะโซล + ควินโตซีน 6% + 24% อีซี อัตรา 30-40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 5 วัน อย่างน้อย 2 ครั้ง

หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำลายซากต้นถั่วลิสงด้วยการไถกลบหน้าดินให้ลึก เพื่อตัดวงจรการระบาดของเชื้อรา และทำความสะอาดอุปกรณ์การเกษตรที่ใช้กับต้นที่เป็นโรคนำกลับมาใช้ใหม่ทุกครั้ง

แปลงที่พบการระบาดของโรคลำต้นเน่า เกษตรกรควรสลับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน เช่น ข้าวโพด เป็นต้น เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค แต่ถ้ายังต้องการจะปลูกถั่วลิสงต่อไป ควรทำแปลงปลูกให้มีการระบายน้ำที่ดี เตรียมดินก่อนปลูกด้วยการไถพรวนพลิกหน้าดินให้ลึกจากผิวดินมากกว่า 20 ซม. และตากดินไว้ให้นานกว่า 2 สัปดาห์ จากนั้นให้โรยด้วยปูนขาวหรือโดโลไมท์ก่อนปลูกเพื่อปรับสภาพดิน อีกทั้งควรจัดระยะปลูกให้เหมาะสม ให้โคนต้นโปร่งและมีแสงแดดส่องถึง