

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

กยท.วางแผนสู้โรคใบร่วงระบด ชีตเส้นตายยับยั้งให้ได้ก่อนพ.ค.

ประธาน กยท.นำทีมลงพื้นที่ภาคใต้สำรวจสวนยางพาราโดนโรคใบร่วงทำลายกว่า 900,000 ไร่ โดยเฉพาะสวนยางตามเขตภูเขา มีความชื้นสูง ระบดหนัก แรงประธานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการช่วยเหลือยับยั้งโรคให้ได้ก่อนเดือนพฤษภาคม ย้ำพี่น้องเกษตรกรให้หมั่นสังเกตรอยโรค

นายประพันธ์ บุญยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่สำรวจสวนยางพาราทางภาคใต้ของประเทศไทย พบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ มีสาเหตุจากเชื้อรากลุ่ม Colletotrichum sp. และ Pestalotiopsis sp. ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสตูล กว่า 900,000 ไร่ บริเวณที่พบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่มากที่สุดคือ สวนยางพาราใน จ.นราธิวาส ประมาณ 720,000 ไร่ รองลงมาคือ จ.ยะลา โดยเฉพาะสวนยางพาราในเขตอำเภอรามัน และอำเภอบันนังสตา รวมพื้นที่สวนยางเสียหายกว่า 90,000 ไร่ ในส่วนของปัตตานี และสตูลพบการระบาดของโรคประปราย

สำหรับโรคใบร่วงชนิดใหม่นี้มีการระบาดในอินโดนีเซียมาก่อน มีสวนยางได้รับความเสียหายไปกว่า 2.5 ล้านไร่ จากนั้นได้เข้ามาระบาดในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี 2562 มีสวนยางได้รับผลกระทบ 700,000 ไร่ แต่ครั้งนั้น ต้นยางไทยยังแข็งแรงยังให้น้ำยางได้ อย่างไรก็ตาม ต่อมาปี 2563-ปัจจุบัน มีการระบาดอีกครั้งกว่า 900,000 ไร่ดังกล่าว โดยครั้งนี้ยอดอ่อนยางโดนทำลาย ไม่สามารถให้น้ำยางได้ ทำให้น้ำยางสดจากจ.นราธิวาสลดลงจากตลาดกว่าครึ่งจากสถานการณ์ปกติ

“ในปีนี้อาจบ่งชี้ถึงเหตุว่าบริเวณที่มีการแพร่ระบาดของหนักเป็นสวนยางพาราที่ปลูกบนภูเขาและมีความชื้นในอากาศสูง ส่วนสวนยางในพื้นที่ราบมีการระบาดไม่รุนแรงดังนั้น ขณะนี้กยท.ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นเร่งคิดค้นแผนช่วยเหลือ รวมทั้งองค์ความรู้เพื่อยับยั้งโรคระบาดในพื้นที่ทั้ง 2 แบบดังกล่าว เบื้องต้นสามารถยับยั้งโรคได้ โดยวิธีผสมผสานระหว่างสารชีวภัณฑ์ สารเคมีบวกกับกระบวนการจัดการสวนที่ดี” ประธานกรรมการ กยท.กล่าว

ทั้งนี้ พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางจะต้องหมั่นสังเกตใบยางที่ร่วงว่ามีร่องรอยของโรคหรือไม่ หากมีแผลที่ใบยางแสดงว่าต้นยางติดเชื้อแล้ว ขณะนี้กยท.ได้ดำเนินการเผยแพร่เอกสารเพื่อให้ความรู้เรื่องโรคใบร่วงชนิดใหม่แจกจ่ายไปในพื้นที่ทั้งหมดแล้ว พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องโรคให้พื้นที่ทั้งช่องทางวิทยุท้องถิ่น เสียงตามสาย บ้ายประกาศ เป็นต้น

“ช่วงนี้ยางเริ่มผลัดใบ เชื้อหยุดระบาดเนื่องจากไม่มีอาหาร กยท.จะต้องเร่งดำเนินการทำแผนงานระงับยับยั้ง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ทั้ง 2 แบบอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพโดยด่วนที่สุด อย่างช้าภายในเดือนพฤษภาคมหรือก่อนฤดูฝนที่เป็นฤดูที่เหมาะสมแก่การเติบโตของเชื้อโรค เพื่อป้องกันพื้นที่ปลูกยางอีกกว่า 2 ล้านไร่คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรวม 400,000 บาท ไม่ให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้ จากความร่วมมือของหน่วยงานทุกฝ่าย กยท.มีความเชื่อมั่นในการควบคุมโรคระบาดครั้งนี้ได้ และยังถือว่าโชคดีที่พื้นที่ปลูกสวนยางพาราในภาคเหนือและภาคอีสานยังไม่พบรายงานรอยโรคใบร่วงชนิดใหม่แต่อย่างใด” นายประพันธ์กล่าว