

# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

## วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2564

คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : มั่นสำปะหลังระวังเพลี้ยหอยเกล็ดขาว



ใกล้เข้าสู่ฤดูฝน แต่หลังจากนั้นไม่นานเริ่มเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วง กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังให้เฝ้าระวังการเข้าทำลายของเพลี้ยหอยเกล็ดขาว สามารถพบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง แต่จะพบมากในมันสำปะหลังที่เพิ่งปลูกใหม่อายุ 1-3 เดือน

เริ่มแรกจะพบตัวเต็มวัยเพศเมียมีแผ่นคล้ายเปลือกหอยแมลงภู่มากุมลำต้น รูปร่างยาวรี เมื่อเปิดแผ่นปกคลุมลำต้นขึ้น จะพบตัว เพลี้ยหอยเกล็ดขาว ขนาดเล็ก ลำตัวสีเหลืองอ่อนจนถึงสีเหลืองเข้ม ดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณลำต้น ก้านใบ และหลังใบ ทำให้ใบเหลืองและร่วง หากเพลี้ยหอยเกล็ดขาวปกคลุมทั้งลำต้น จะทำให้ต้นแห้งตายได้

การป้องกันกำจัด ก่อนปลูก ให้เกษตรกรเลือกใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่สะอาดปราศจากเพลี้ยหอยเกล็ดขาว หรือให้แช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังด้วยสารฆ่าแมลง มาลาไทออน 83% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไทอะมีทอกแซม 25% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อิมิดาคลอพริด 70% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร แช่ท่อนพันธุ์นาน 10 นาที จากนั้นให้นำท่อนพันธุ์ไปผึ่งให้แห้งก่อนนำมาปลูก และ หลังปลูก ให้เกษตรกรหมั่นสำรวจการระบาดของเพลี้ยหอยเกล็ดขาวอย่างสม่ำเสมอ ถ้าพบการระบาดให้ถอนและเก็บต้นมันสำปะหลังที่พบเพลี้ยหอยเกล็ดขาว นำไปทำลายทิ้งนอกแปลงปลูก

จากนั้นให้ฉีดพ่นด้วยสารฆ่าแมลง ไทอะมีทอกแซม 25% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 4 กรัม ผสมกับ ไวต์ออยล์ 67% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อิมิดาคลอพริด 70% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 4 กรัม ผสมกับ ไวต์ออยล์ 67% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

ขอแนะนำสำคัญในการผสมสารเคมีกำจัดเพลี้ยหอยเกล็ดขาว ให้ผสมในน้ำปริมาณน้อย เมื่อคนให้ละลายเข้ากันดีแล้ว ถึงจะค่อยเติมน้ำจนได้ปริมาตร ที่ต้องการ และให้ฉีดพ่นเฉพาะในจุดที่พบเพลี้ยหอยเกล็ดขาวเข้าทำลาย

สะ-เล-เต