

# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2563

## โรคใบจุดต่างๆ เหลือ 20 ไร่ เตือนหน้าฝน..อาจหวนคืน



กยท.เผยโรคจุดใบร่วงชนิดใหม่ ที่ติดเชื้อจากมาเลเซีย เข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ ตอนล่าง 10 จังหวัด ลามระบาดไปกว่า 8 แสนไร่ ล่าสุดเหลือแค่ 20 ไร่ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี แต่เพียงระวังหน้าฝนอาจจะกลับมา

นายกฤษฎา สังข์สิงห์ ผอ.สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยถึง

สถานการณ์ล่าสุดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ปัจจุบันมีแนวโน้มดีขึ้น หลังลงพื้นที่สำรวจสวนยางพาราที่เคยได้รับรายงานการติดเชื้อทั้ง 10 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล พังงา ตรัง พัทลุง กระบี่ และสุราษฎร์ธานี

“การระบาดของโรคดังกล่าวที่มีมาตั้งแต่ ก.ย.ปีที่แล้ว ส่งผลให้มีต้นยางพาราติดเชื้อเกือบ 8 แสนไร่ทั่วประเทศ แต่หลังจาก กยท.ได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) เร่งแก้ปัญหาด้วยการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หาเชื้อ และนำระบบดาวเทียมเข้ามาช่วยสำรวจพื้นที่ที่ติดเชื้อ รวมถึงใช้สารเคมีในกลุ่มกำจัดเชื้อรา ฉีดพ่นสวนยางที่ติดเชื้อด้วยเครื่องพ่นแรงดันสูงแบบลากสาย และแอร์บรัช จะให้ประสิทธิภาพดีที่สุด ทำให้ปัจจุบันมีต้นยางพาราที่ยังคงติดเชื้อโรคใบร่วงฯ ยังหลงเหลืออยู่เพียง 20 ไร่ ใน จ.สุราษฎร์ธานี เท่านั้น”



กฤษฎา ยังเผยอีกว่า ปัจจัยที่ทำให้โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราดีขึ้น ผลพวงส่วนหนึ่งมาจากการผลัดใบตามธรรมชาติของต้นยางพารา เนื่องจากเชื้อราชนิดนี้ จะอาศัยอยู่บนบริเวณพุ่มใบของต้นยางพารา เมื่อยางพาราผลัดใบร่วงจนหมดทำให้เชื้อราหายไปค่อนข้างเยอะ ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นทำให้ไม่เหมาะสมต่อการเข้าทำลายของเชื้อ

“ขอฝากเตือนเกษตรกร จะต้องหมั่นตรวจสอบสวนยางพาราของตนเอง และบำรุงต้นยางอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากช่วงยางผลัดใบ ต้นยางพาราจะค่อนข้างอ่อนแอ ควรใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยางพาราอย่างสม่ำเสมอ และในช่วงฤดูฝนนี้ สภาพภูมิอากาศอาจจะเอื้ออำนวยต่อการเพาะเชื้อโรคกลับมาอีก ดังนั้น เกษตรกรไม่ควรชะล่าใจ หากพบการระบาดหรือติดเชื้อให้รีบแจ้ง กยท.ในพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เชื้อหวนกลับมาเกิดขึ้นซ้ำอีก”