

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับวันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564

คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : เพลี้ยกระโดดระบาดในอีสาน



จากการมอบหมายของกรมการข้าวให้หน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เร่งออกสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีพบว่าพื้นที่ บ.หนองไฮ ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสี

น้ำตาลในพื้นที่สำรวจ ประมาณ 10 ไร่ ข้าวแห้งตายเป็นหย่อมๆ มีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวอ่อนและตัวเต็มวัยในแปลงมากกว่า 500 ตัวต่อต้น และเริ่มมีการอพยพไปยังแปลงอื่นในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแปลงที่ยังอยู่ในระยะข้าวตั้งท้องและระยะออกดอก

เพื่อเป็นการป้องกันกำจัดการแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล นายอชาษฐ์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว แนะนำระยะนี้ให้เกษตรกรต้องหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ หากพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลไม่ควรขังน้ำในแปลงนาตลอดเวลา ควรปล่อยให้ระดับน้ำมีพอแค่ดินเปียก เพื่อให้สภาพนิเวศในแปลงนาไม่เหมาะสมต่อการขยายประชากรของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และยังเป็นวิธีทำให้มอดสามารถขึ้นมากัดกินตัวอ่อนของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้อีก

ในส่วนของระยะก่อนข้าวตั้งท้อง เมื่อตรวจพบตัวอ่อนของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล วัยที่ 1-2 มากกว่า 1 ตัวต่อต้น ให้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลงบูโพรเพซิน หรืออีโทเฟนพรอกซ์ หรือไอโซโปรคาร์บ ฉีดพ่นในอัตราตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในฉลาก

สำหรับในระยะข้าวตั้งท้องถึงออกรวง หากตรวจพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 10 ตัวต่อกอหรือ 1 ตัวต่อต้น และไม่พบมวนเขี้ยวดูดไข่หรือมวนน้อยมาก ให้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลงไดโนทีฟูเรน หรือไพมีโทรซิน และในระยะข้าวใกล้เก็บเกี่ยว หากพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยบินมาเล่นแสงไฟตามบ้านให้ใช้เครื่องดูดแมลงล่อ หรือกับดักกาฬเหลืองล่อทำลาย เพื่อลดจำนวนของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่จะอพยพไปยังแปลงข้าวปลูกใหม่